Peces del Río Uruguay - Liceo de Nuevo Berlín

Orden: Characiformes
Familia: Erythrinidae
Especies: *Hoplias malabaricus* (Bloch 1794)
Hoplias lacerdae (Miranda Ribeiro, 1908).
Nombres Comunes: Tararira, Tráira, Moncholo

Tararira de Río *H. lacerdae*

Tararira de Laguna o Arroyo *H. malabaricus*

Foto: Franco Teixeira de Mello

Distribución: Sudamérica: Ríos, arroyos y lagunas de las áreas costeras y planicies interiores de Río Grande del Sur (Brasil), Argentina y Uruguay (FishBase, 2009).

Distribución en Uruguay: Se la puede encontrar en todas las cuencas de nuestro país (Información: Colección Zoología de Vertebrados, Facultad de Ciencias, UdelaR, Uruguay.

Características biológicas: *Hoplias malabaricus* es una especie de tamaño medio a grande pudiendo alcanzar 90 cm de largo y 12 kilos (Vaz-Ferreira, 1969). De cuerpo alargado semicilíndrico, cabeza maciza, cuboide, con gran desarrollo de la mandíbula, provista de gran musculatura. Su boca posee caninos implantados en los mandibulares (en una sola serie) y en el paladar. Posee una única aleta dorsal, la aleta caudal es redondeada, careciendo de escotadura. En Uruguay existen al menos dos especies, una segunda corresponde a la llamada Tararira de río o tornasol (*Hoplias lacerdae*). Esta especie se diferencia de la llamada tararira de laguna por su coloración tornasolada y mayor tamaño (Taller Liceo Nuevo Berlín y Pescadores artesanales). Habita en arroyos, lagunas y bañados, en momentos de sequía tiene una gran capacidad de soportar condiciones de muy bajo oxigeno en agua debido a múltiples características fisiológicas (citas en Ríos *et al*., 2002). Hay que destacar que ninguna de estas especies están restringidas a un único ambiente lagunas o ríos, ambas se pueden encontrar en ambos ambientes.

Reproducción: La tararira se reproduce generalmente en la primavera, la pareja hace un nido en el sedimento, en general en la cercanía de zonas con plantas o entre las plantas. La hembra deposita huevos en mas de una ocasión y cada puesta puede diferir de 15 días. Cuando los huevos eclosionan los padres cuidan de los alevines por algunos días.

Pesca: Por su tamaño, calidad de carne y abundancia es objeto de exploración comercial. En las lagunas de la provincia de Buenos Aires se la pesca en primavera, verano y otoño y encargado con peces con peces vivos. La pesca deportiva de esta especie, con señuelos y con mosca, tiene numerosos adeptos.

Otros datos: En la época de reproducción los adultos pueden ser peligrosos pudiendo morder a una persona que se aproxime al nido. Es una especie de gran importancia en la pesca deportiva y comercial. En nuestro país se ha detectado por parte de los pescadores artesanales una importante disminución en sus abundancias, sobre todo en el río Negro (San Gregorio, Uruguay).

Autores: *estudiantes de 5to biológico (2009)*
Coordinadores*: profesora Mariana Romero y Franco Teixeira de Mello.*
Colaboradores*: pescadores artesanales de Nuevo Berlín, Iván González, Mariana Ríos y Natalia Zaldúa.*
Ficha creada en el marco del Proyecto "Red de monitores locales para cuantificar el impacto ambiental de cultivos de soja y forestal en la cuenca del Sitio Ramsar Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay" (Vida Silvestre/UICN-NL).

Bibliografía:

Froese R & Pauly D. Editors. 2009. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (01/2009).

Ríos FS, Kalinin AL, & Rantin FT. 2002.The effects of long-term food deprivation on respiration and haematology of the neotropical fish *Hoplias malabaricus. Journal of Fish Biology* 61, 85–95

UICN 2008. 2008. UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>

Vaz-Ferreira, R. 1969 Peces del Uruguay. Nuestra tierra 23, 72 p. Editorial Nuestra Tierra, Montevideo, Uruguay.

Zaniboni Filho E, Meurer S, Shibatta OA, & de Oliverira Nuñes AP. 2004 Catálogo ilustrado de peixes do alto Rio Uruguai. Florianópolis : Editora da UFSC : Tractebel Energia. 128 p.

Ecosystems Grants Programme
EGP
THE NETHERLANDS

VIDA SILVESTRE
URUGUAY